

レジメン名	診療科
nab-PTX+GEM	消化器内科

適応疾患	膵癌
------	----

1クール	28日間
総クール	奏功中継続
休薬期間	13日間

薬剤名(一般名)	投与量(mg/m <sup>2</sup> )	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
アルブミン懸濁型パクリタキセル	125mg/m <sup>2</sup>	d1, 8, 15
ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	d1, 8, 15

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

番号	薬剤名・用量(mg/m <sup>2</sup> )	投与方法	投与速度	投与日 (d1~5等)
①	デキサート 8mg+アロキシ 0.75mg+Ns 50mL	DIV	30分	d1,8,15
②	アブラキサン125mg/m <sup>2</sup> (100mgあたり生食20mLで溶解)	DIV	30分	d1,8,15
③	Ns 50mL(フラッシュ用)	DIV	15分	d1,8,15
④	ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup> +Ns 100mL	DIV	30分	d1,8,15
⑤	Ns 50mL(フラッシュ用)	DIV	15分	d1,8,15
⑥				

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

1段階減量 nab-PTX:100mg/m<sup>2</sup> , GEM:800mg/m<sup>2</sup>

2段階減量 nab-PTX:75mg/m<sup>2</sup> , GEM:600mg/m<sup>2</sup>