

ペルツズマブ＋トラスツズマブ＋ドセタキセル療法

【対象症例】

HER2陽性の転移性乳癌

【登録診療科】

乳腺外科

【治療計画】

順番	薬剤名	推奨投与量	投与時間	投与日
①	ペルツズマブ	(※1)	(※2)	day1
	生理食塩水	250mL		
②	生理食塩水	50mL	フラッシュ	day1
③	トラスツズマブ	(※3)	(※4)	day1
	生理食塩水	250mL		
④	生理食塩水	50mL	フラッシュ	day1
⑤	デキサメタゾン	9.9mg	30分	day1
	パロノセトロン	0.75mg		
	生理食塩水	50mL		
⑥	ドセタキセル	75mg/m ²	60分	day1
	5%ブドウ糖	250mL		
⑦	生理食塩水	50mL	フラッシュ	day1
内服①	デキサメタゾン	8mg	朝、昼食後	day2,day3,day4
※1 初回投与時:840mg、2 回目以降:420mg				
※2 初回投与時間は60分間。忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可能				
※3 初回投与時には8mg/kg(体重)を、2回目以降は6mg/kg				
※4 初回投与時間は90分。忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可能				
【投与スケジュール】1コース 21日間				