

GEM+CDDP (3週間ごと)療法(泌尿器)

【対象症例】 尿路上皮がん(腎盂がん、尿管がん、膀胱がん)

【登録診療科】 泌尿器科

【治療計画】

順番	薬剤名	推奨投与量	投与時間	投与日
①	生理食塩水	100mL	30分	day1、day8
	デキサメタゾン	9.9mg		
②	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1、day8
	生理食塩水	100mL		
③	生理食塩水	50mL	フラッシュ	day1、day8
(1)	生理食塩水	500mL	4本(変則時間)	day1終了後～day2 朝8時まで
(2)	生理食塩水	500mL	1時間	day2
(3)	生理食塩水	500mL	1時間	
内服①	アプレピタント	125mg	化学療法施行 60～90分前内服	day2
(4)	生理食塩水	100mL	30分	day2
	パロノセトロン	0.75mg		
	デキサメタゾン	6.6mg		
(5)	フロセミド注	20mg	30分	day2
	生理食塩水	50mL		
(6)	シスプラチン	70mg/m ²	2時間	day2
	生理食塩水	500mL		
(7)	生理食塩水	500mL	1時間	day2
(8)	生理食塩水	500mL	1時間	day2
(8) (8)の30分後 より開始	フロセミド注	20mg	30分	day2
	生理食塩水	50mL		
(9)	生理食塩水	500mL	8時間	day2
(10)	生理食塩水	500mL	8時間	day3
内服②	アプレピタント	80mg	朝食後	day3,day4
内服③	デキサメタゾン	8mg	朝、昼食後	day3,day4,day5

【投与スケジュール】 1コース 21日間

注意: day1のみは③終了後に(1)を開始すること