

FOLFIRI+Cmab療法(大腸)

【対象症例】 KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 【登録診療科】 消化器外科

【治療計画】

順番	薬剤名	推奨投与量	投与時間	投与日
①	デキサメタゾン	6.6mg	30分	day1,day8
	d-クロルフェニラミン	10mg		
	グラニセトロン	3mg		
②	セツキシマブ	(※1)	(*3)	day1,day8
	生理食塩水	(※2)		
③	生理食塩水	50mL	15分	day1,day8
④	レボホリナート	200mg/㎡	2時間	day1
	5%ブドウ糖	250mL		
④’ ④と並列	イリノテカン	150mg/㎡	2時間	day1
	5%ブドウ糖	250mL		
⑤	フルオロウラシル(全開)	400mg/㎡	全開	day1
	5%ブドウ糖	50mL		
⑥	フルオロウラシル(持続)	2400mg/㎡	46時間	day1
	生理食塩水	100mL(全量)		
(*1) 初回投与時:400mg/㎡、2回目以降:250mg/㎡				
(*2) 初回投与時:500mL、2回目以降:250mL				
(*3) 初回投与時:120分、2回目以降:60分				
【投与スケジュール】 1クール 14日間				