

Pembrolizumab＋GEM+CDDP療法

【対象症例】

胆道癌

【登録診療科】

消化器外科

【治療計画】

順番	薬剤名	推奨投与量	投与時間	投与日
①(1)	生理食塩水	50mL	ルートキープ	day1
②(2)	ペムブロリズマブ	200mg	30分	day1
	生理食塩水	192mL		
③(3)	生理食塩水	50mL	フラッシュ	day1
④ I	KN1号	500mL	1時間	day1、day8
⑤ II	生理食塩水	500mL	1時間	day1、day8
	硫酸Mg	8mL		
内服① 内服 I	アプレピタント	125mg	化学療法施行 60～90分前内服	day1、day8
⑥ III	デキサメタゾン	9.9mg	30分	day1、day8(1～8 コース目まで)
	パロノセトロン	0.75mg		
	生理食塩水	100mL		
⑦ IV	シスプラチン	25mg/m ²	1時間	day1、day8
	生理食塩水	250mL		
(4)	デキサメタゾン	6.6mg	30分	day1、day8(9 コース目以降)
	生理食塩水	100mL		
⑧ V(5)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1、day8
	生理食塩水	100mL		
⑨ VI(6)	生理食塩水	500mL	1時間	day1、day8
内服② 内服 II	アプレピタント	80mg	朝食後	day2、day3、day9、day10

day1,2,3は○数字、day8,9,10はローマ数字を参考にする

最大8コースまで繰り返し、その後(1)(2)(3)(4)(5)(6)のみを21日周期で投与を継続する(必要に応じてゲムシタビン継続)

【投与スケジュール】 1コース 21日間