

レジメン名

XELOX (CapeOX)

出典 エルプラット適正使用ガイド2012年3月作成
ゼロダ適正使用ガイド2011年11月改訂

実施部署区分

入院
 外来
 処置

対象疾患

結腸・直腸癌
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

WBC	2000/mm ³ 未満	PLT	50000/mm ³ 未満
その他	上記の時の減量の目安 L-OHP: 130mg/m ² →100mg/m ² →85mg/m ² Capecitabine: 2000mg/m ² →1600mg/m ² →1280mg/m ² CLcrが30-50mL/minの患者ではCapecitabineを25%減量		

投与中止の基準

WBC	3000/mm ³ 未満	PLT	75000/mm ³ 未満
CLcr	30mL/min未満		
その他	神経毒性、アレルギーに注意		

1クール期間

総コース数

(次のクールまでの標準期間)

進行・再発: PDまで
術後補助: 8コース

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
オキサリプラチン(エルプラット)	130mg/m ²	5%糖液 500mL	2時間	d1
カペシタビン	2000mg/m ² ※	朝、夕食後		d1夕-15朝
	※体表面積ごとで投与量を決める 1.36m ² 未満: 1200mg/回 × 1日2回 1.36m ² 以上~1.66m ² 未満: 1500mg/回 × 1日2回 1.66m ² 以上~1.96m ² 未満: 1800mg/回 × 1日2回 1.96m ² 以上: 2100mg/回 × 1日2回			

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 ①生食100mL (ルート確保用) ②アロキシ0.75mg+デキサート6.6mg +生食50mL (15分) ③エルプラット130mg/m ² +5%糖液250mL または 500mL (2時間) ④生食50mL(フラッシュ用) day1夕-15朝 カペシタビン錠 2000mg/m ² 分2で服用