

レジメン名

GEM+CDDP療法

出典 N Engl J Med 2010;362:1273-1281
Br J Cancer 2010; 103:469-474
ジェムザール適正使用ガイド

実施部署区分

入院
 外来
 処置

対象疾患

胆道がん
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

項目	ゲムシタビン	シスプラチン
グレード4 (500/mm ³ 未満)の好中球数減少	1000-800mg/m ²	変更なし
2万/mm ³ 未満の血小板数減少または血小板輸血の実施	1000-800mg/m ²	変更なし
実施医療機関の基準値上限の10倍を超えるAST (GOT) /ALT (GPT) 上昇	1000-800mg/m ²	変更なし
実施医療機関の基準値上限の1.5倍を超える血清クレアチニン上昇	変更なし	休業

1クール期間 21日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
シスプラチン	25mg/m ²	NS500mL	90分	day1、8
ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%糖液 100mL	30分	day1、8

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1、8
①ソリタ 500mL (90分)
②アロキン0.75mg+テキサト6.6mg+生食50mL (15分)
③シスプラチン25mg/m ² +生食500mL (90分)
④ゲムシタビン1000mg/m ² +5%糖液100mL (30分)
⑤生食50mL (全開で)
<前投薬>アプレピタントカプセル適宜投与