

レジメン名

DP(DTX+PSL)

出典 がん化学療法レジメンハンドブック(改訂第7版)

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

前立腺がん

■進行・再発

投与速度の変更

特記事項なし

投与減量の基準

その他

投与中止の基準

好中球	2,000/mm ³ 未満
その他	上記に該当する場合、延期。 〈肝障害時の中止基準〉米国添付文書より T-Bil > ULN AST,ALT > 1.5 × ULNかつALP > 2.5 × ULN

1コース期間 21
(次のコースまでの標準期間)

総コース数 4~6

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ドセタキセル(DTX)	※70mg/m ²	5%TZ 250mL	2時間	day1
内服 プレドニン(PSL)	10mg	朝・夕食後		day1-21(連日服用)
※ドセタキセルの用量はレジメンハンドブックより少量の70mg/m ² で				

1日投与順 (経時的にプレドニケーション・ ホストメドケーション、溶解液まで含む)
day1 ①グラニセトロンバッグ(100mL) (30分) ②ドセタキセル70mg/m ² +5% TZ250mL (2時間) ③5% 糖液 250mL (1時間)
day4 ①フィルグラスチムBS75 μg 皮下注
day1-21 ①プレドニン錠(5mg) 2T 分2で服用