

レジメン名

Cabazitaxel

出典 がん化学療法レジメンハンドブック(改訂第7版)

実施部署区分

入院
 外来
 処置

対象疾患

前立腺がん

■進行・再発

投与速度の変更

特記事項なし

投与減量の基準

その他

投与中止の基準

好中球	2,000/mm3未満
その他	上記に該当する場合、延期。 〈肝障害時の中止基準〉米国添付文書より T-Bil > ULN AST,ALT > 1.5 × ULNかつALP > 2.5 × ULN

1コース期間 21
(次のコースまでの標準期間)

総コース数 PDまで

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
カバジタキセル(ジェブタナ)	※25mg/m ²	5%TZ もしくは 生理食塩液 250mL	1時間	day1
内服 プレドニン(PSL)	10mg	朝・夕食後		day1-21(連日服用)

1日投与順 (経時的にプレドニケーション・ ホストメドイケーション、溶解液まで含む)
<p>day1</p> <p>①ボラミン5mg＋デキサート6.6mg＋ファモチジン20mg＋生理食塩液100mL (30分)</p> <p>②ジェブタナ25mg/m²＋ 5%糖液or生理食塩液250mL (1時間)</p> <p>③フラッシュ用 5%糖液もしくは 生理食塩液50mL (全開)</p> <p>day3</p> <p>①ジーラスタ 3.6mg 皮下注</p> <p>day1-21</p> <p>①プレドニン錠(5mg) 2T 分2で服用</p>