

レジメン名

CAG

出典 Int J Hematol.2005;82:48-54.
Journal of Hematol.&Oncol. 2011;4:46

実施部署区分

入院
 外来
 処置

対象疾患

AML

進行・再発
補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

その他			

1クール期間 28日
(次のクールまでの標準期間)

総クール数 1クール

投与中止の基準

その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度	投与日(d1, d8等)
アクリルピシン(アクリルピシン)	14mg/m ² (※1)	輸液100mL	30分	day1-4、(+day8-10)
シタラピン(キロサイド)	20mg/m ²	輸500mL (※2)	24時間 (※2)	day1-14
フィルグラスチム	75 μg	皮下注		day1-14
※1 70歳以上ではアクリルピシンを10mg/m ² に減量する。				
※2 皮下注射も可。				

1日投与順 (経時的にプレメタキオン・ポストメタキオン、 溶解液まで含む)
day1-4 ①グラニセトロンバッグ3mg(15-30分) ②アクリルピシン14mg/m ² +輸液100mL(30分) ③キロサイド20mg/m ² +生食500mL(24時間) ④生食50mL(フラッシュ用) ⑤皮下注)フィルグラスチム75 μg
day5-14 ①キロサイド20mg/m ² +生食500mL(24時間) ②皮下注)フィルグラスチム75 μg