レジメン名

MIT＋Ara-C

出典　JALSG AML201

実施部署区分

■入院　□外来　□処置

対象疾患

AML地固め療法1コース目（CBF(−)）

□進行・再発
□補助療法（術前・術後）
■初発
□

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

その他			

1クール期間　28日
（次のクールまでの標準期間）

総クール数　1クール

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度（時間）	投与日(d1、d8等)
ミトキサントロン	7mg/m^2	NS100mL	30分	d1-3
シタラビン	200mg/m^2	輸液1000mL	24時間	d1-5

1日投与順
（経時的にﾌﾟﾚﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ・ﾎﾟｽﾄﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ、溶解液まで含む）

day1～3

①´(側管)グラニセトロンバッグ3mg（15-30min）
②´ノバントロン7mg/m^2＋生食100mL（30min）
③´生食50mL　フラッシュ用

①生食50mL　ルート確保用（day1のみ）
②キロサイド200mg/m^2＋輸液1000mL(24hr)

day4、5
①キロサイド200mg/m^2＋輸液1000mL(24hr)
②生食50mL　フラッシュ用（day6のみ）