

レジメン名

VP-16+Ara-C+VCR+VDS

出典 JALSG AML201

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	-----------------------------	-----------------------------

対象疾患

AML地固め療法4コース目 (CBF(-))
<input type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法 (術前・術後) <input checked="" type="checkbox"/> 初発 <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

その他			

1クール期間 28日

総クール数 1クール

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
エトポシド	100mg/m ²	輸液500mL	3時間	d1-5
シタラビン(キロサイド)	200mg/m ²	輸液1000mL	24時間	d1-5
ビンクリスチン(オンコビン)	0.8mg/m ²	輸液100mL	30分	d8
ビンデシン(フィルデシン)	2mg/m ²	輸液100mL	30分	d10

1日投与順 (経時的にプレドニゾン・ポストドニゾン、 溶解液まで含む)
<p>day1~5</p> <p>①(側管)グラニセトロンバッグ3mg(15-30min)</p> <p>②エトポシド100mg/m²+輸液500mL(3hr)</p> <p>③生食50mL フラッシュ用</p> <p>①生食50mL ルート確保用(day1のみ)</p> <p>②キロサイド200mg/m²+輸液1000mL(24hr)</p> <p>③生食50mL フラッシュ用(day6のみ)</p> <p>day8</p> <p>①生食50mL ルート確保用</p> <p>②オンコビン0.8mg/m²+輸液100mL(30min)</p> <p>③生食50mL フラッシュ用</p> <p>day10</p> <p>①生食50mL ルート確保用</p> <p>②フィルデシン2mg/m²+輸液100mL(30min)</p> <p>③生食50mL フラッシュ用</p>