

レジメン名

Ph陰性ALL地固め療法(C1)

出典 JALSG ALL202

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	-----------------------------	-----------------------------

対象疾患

Ph陰性ALL (25歳以上60歳未満)
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input checked="" type="checkbox"/> 初発 <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

Cr	2.01mg/dL以上		
その他	Ara-Cを50%に減量		

投与中止の基準

WBC	3000/mm3未満	ANC	1500/mm3未満※
Plt	10万/mm3未満※		
その他	※4クール目では ANC 1000/mm3未満 Plt 8万/mm3未満で中止		

1クール期間

総クール数

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
メトレキサート	15mg/body	髄注		d1
デキサメタゾン	3.3mg/body	髄注		d1
シタラビン	2000mg/m2/ 回 を1日2回	輸液400mL	3時間	d1-3
エトポシド	100mg/m2	輸液500mL	3時間	d1-3
デキサメタゾン	33mg/body		30分	d1-3

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
d1 ①メトレキサート15mg+生食2-6mL(髄注) ②デキサート3.3mg(髄注)
day1 ①グラニセトロン3mgバッグ+デキサート33mg(30min) ②キロサイド2000mg/m2+輸液400mL(3hr) ③ラステット100mg/m2+輸液500mL(3hr) ④生食50mL(フラッシュ用)
①と12時間あけて ⑤グラニセトロン3mgバッグ(30min) ⑥キロサイド2000mg/m2+輸液400mL(3hr) ⑦生食50mL(フラッシュ用)