

レジメン名

APL204寛解導入法【C群】

出典

実施部署区分

入院
 外来
 処置

対象疾患

急性前骨髄性白血病

進行・再発
 補助療法(術前・術後)
 初発
 WBC \geq 10000

投与減量の基準

WBC			
その他			

※1クール期間 45日間または完全寛解まで 総クール数 1クール
 (次のクールまでの標準期間)

※内服連日のため上記コース期間は目安

投与中止の基準

WBC	3000 未満		
その他	かつ APL細胞<1000		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ATRA(ベサノイド)	45mg/m ²	経口	分3	d1-連日
イダマイシン(IDA)	12mg/m ²	点滴静注	30分	d1-3
キロサイド(Ara-C)	100mg/m ²	持続静注	24時間	d1-7

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ホスト Medikation、 溶解液まで含む)
内服 day1-連日 ベサノイド45mg/m ² 分3(食後)
day1-3 ①グラニセトロン3mg/バッグ100mL(15-30min) ②イダマイシン12mg/m ² +注射用水5mL/V+輸液適量(30min) ③キロサイド100mg/m ² +生食1000mL(24hr)
day4-7 ①グラニセトロン3mg/バッグ100mL(15-30min) ②キロサイド100mg/m ² +生食1000mL(24hr)