

レジメン名

APL204地固め療法  
【C群-1コース目】

出典

実施部署区分

入院
 外来
 処置

対象疾患

急性前骨髄性白血病  
 進行・再発  
 補助療法(術前・術後)  
 初発  
 寛解導入療法後に

投与減量の基準

WBC			
その他			

1クール期間

28-30日

総クール数

1クール

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

WBC	3000 未満	PLT	10万未満
その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ノバントロン(MIT)	7mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1-3
キロサイド(Ara-C)	200mg/m <sup>2</sup>	持続静注	24時間	d1-5

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ホスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1-3 ①グラニセトロン3mg/バッグ100mL(15-30min) ②ノバントロン(30min) + 生食100mL(30min) ③キロサイド200mg/m <sup>2</sup> + 生食1000mL(24hr)
day4-5 ①グラニセトロン3mg/バッグ100mL(15-30min) ②キロサイド200mg/m <sup>2</sup> + 生食1000mL(24hr)