

レジメン名

**APL204地固め療法
【C群-2コース目】**

出典

実施部署区分

<input type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
-----------------------------	--	-----------------------------

対象疾患

急性前骨髄性白血病
<input type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> 初発 <input checked="" type="checkbox"/> 地固め療法 C-1コース終了後 可及的速やかに開始

投与減量の基準

WBC			
その他			

1クール期間

28-30日

総クール数

1クール

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

WBC	3000 未満	PLT	10万未満
その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ダウノマイシン(DNR)	50mg/m ²	点滴静注	30分	d1-3
キロサイド(Ara-C)	200mg/m ²	持続静注	24時間	d1-5

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1-3 ①グラニセトロン3mg/バッグ100mL(15-30min) ②ノバントロン(30min) + 生食100mL(30min) ③キロサイド200mg/m ² + 生食1000mL(24hr)
day4-5 ①グラニセトロン3mg/バッグ100mL(15-30min) ②キロサイド200mg/m ² + 生食1000mL(24hr)