

レジメン名

**APL204地固め療法  
【C群-3コース目】**

出典

実施部署区分

<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

対象疾患

<b>急性前骨髄性白血病</b>
<input type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> 初発 <input checked="" type="checkbox"/> 地固め療法 C-2コース終了後 可及的速やかに開始

投与減量の基準

WBC			
その他			

1クール期間

28-30日
--------

総クール数

1クール
------

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

WBC	3000 未満	PLT	10万未満
その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
イダマイシン(IDA)	12mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1-3
キロサイド(Ara-C)	140mg/m <sup>2</sup>	持続静注	24時間	d1-5

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ホスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1-3 ①グラニセトロン3mg/バッグ100mL(15-30min) ②イダマイシン12mg/m <sup>2</sup> +注射用水5mL/V+輸液適量(30min) ③キロサイド140mg/m <sup>2</sup> +生食1000mL(24hr)
day4-5 ①グラニセトロン3mg/バッグ100mL(15-30min) ②キロサイド140mg/m <sup>2</sup> +生食1000mL(24hr)