

レジメン名

A+AVD

出典 アドセトリス適正使用ガイド

実施部署区分

入院
 外来
 処置

対象疾患

未治療のCD30陽性のホジキンリンパ腫

-
- 進行・再発
-
-
- 補助療法(術前・術後)
-
-
- 初発
-
-

投与減量の基準

その他	Grade2の末梢神経障害において、回復後0.9mg/kgに減量して投与継続する Grade3の末梢神経障害において、回復後0.9mg/kgに減量して投与再開する		

投与中止の基準

ANC	1000/mm ³ 未満		
その他	Grade3の末梢神経障害		

1クール期間 28日

総クール数 6クール

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ブレンツキシマブ ベドチン (アドセトリス)	1.2mg/kg	輸液100mL	30分	d1, 15
ドキシルピシン	25mg/m ²	輸液適量 計100mL	30分	d1, 15
ビンブラスチン(エクザール)	6mg/m ² (上限10mg)	輸液100mL	30分	d1, 15
ダカルバジン	375mg/m ²	AQ10mL/Vで溶解 輸液500mLに希釈	3時間	d1, 15

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1, 15
①グラニセトロン3mg/バッグ+デキサート 13.2mg(15-30min)
②ドキシルピシン25mg/m ² +輸液適量(30min)
③エクザール6mg/m ² +輸液100mL(30min)
④ダカルバジン375mg/m ² +注射用水 10mL/V+輸液500mL(3hr) [※] [※] 点滴経路全般を遮光
⑤生食50mL(フラッシュ用)
⑥ヒドロコルチゾン200mg+ポララミン5mg+ 生食100mL(15-30min)
⑦アドセトリス1.2mg/kg+注射用水10.5mL/V (溶解)+輸液100mL(30分)
⑧生食50mL(フラッシュ用)