

レジメン名

hyperCVAD

出典 J Clin Oncol 18:547-561.
J Clin Oncol 23:7013-7023.
Cancer 2006;106:1569-80.

実施部署区分

入院
 外来
 処置

対象疾患

ALL、マントルリンパ腫、バーキットリンパ腫

進行・再発
補助療法(術前・術後)
初発

投与減量の基準

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| その他 | | | |

投与中止の基準

| | | | |
|-------|-------------------------|-----|------------------------|
| ANC | 1000/mm ³ 未満 | PLT | 10万/mm ³ 未満 |
| T-bil | 1.5mg/dL以上 | Cr | 2mg/dL以上 |
| その他 | | | |

1クール期間 21日

総クール数 1,3,5,7クール

(次のクールまでの標準期間)

| 薬剤名・略号 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与速度(時間) | 投与日(d1, d8等) |
|-------------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|
| シクロホスファミド(エンドキサン) | 300mg/m ² /回 を2回/日 | 輸液500mL | 3時間 | d1-3 |
| ドキソルビシン | 25mg/m ² | 輸液適量 計100mL | 30分 | d4-5 |
| ピンクリスチン(オンコピン) | 2mg/body | 輸液100mL | 30分 | d4, 11 |
| デキサメサゾン | 33mg/body | 輸液100mL | 30分 | d1-4, 11-14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む) |
|--|
| day1-3 ①グラニセトロン3mg/バッグ+デキサート33mg (30min) ②エンドキサン300mg/m ² +輸液500mL(3hr) ③生食50mL(フラッシュ用) ④グラニセトロン3mg/バッグ(30min) ⑤エンドキサン300mg/m ² +輸液500mL(3hr) ⑥生食50mL(フラッシュ用) |
| day4 ①グラニセトロン3mg/バッグ+デキサート33mg (30min) ②ドキソルビシン25mg/m ² +輸液適量(30min) ③オンコピン2mg/body+輸液100mL(30min) ④生食50mL(フラッシュ用) |
| day5 ①グラニセトロン3mg/バッグ+デキサート33mg (30min) ②ドキソルビシン25mg/m ² +輸液適量(30min) ③生食50mL(フラッシュ用) |
| day11 ①デキサート33mg+輸液100mL(30min) ②オンコピン2mg/body+輸液100mL(30min) ③生食50mL(フラッシュ用) |
| day12-14 ①デキサート33mg+輸液100ml(30min) |