

レジメン名

進行・再発DLd(皮下)

出典 ダラキューロ配合皮下注適正使用ガイド2021年5月作成

実施部署区分

■入院 ■外来 □処置

対象疾患

多発性骨髄腫  
 進行・再発  
 補助療法(術前・術後)

投与中止の基準(ダラキューロ)

ANC	500/mm <sup>3</sup>	PLT	2.5万/mm <sup>3</sup> 未満
Infusion reaction	Grade1.2:回復後、再投与可 Grade3:回復後、再投与可(3回出現で投与中止) Grade4のInfusion reaction:中止		
その他	発熱性好中球減少症、感染症を伴うANC減少、出血を伴うGrade3以上のPLT減少、Grade3以上の非血液毒性(ただし、下記を除く) ・7日以内に制吐薬に反応したGrade3の悪心又は嘔吐 ・7日以内に止瀉薬に反応したGrade3の下痢 ・ベースライン時に認められていた、又はダラキューロ最終投与後7日未満持続するGrade3の疲労又は無力症 ・多発性骨髄腫の徴候に伴うGrade3の疼痛		

投与中止の基準(レブラミド)

ANC	1000/mm <sup>3</sup> 未満	PLT	3万/mm <sup>3</sup> 未満
-----	-------------------------	-----	-----------------------

投与減量の基準(レブラミド)

ANC	1000/mm <sup>3</sup> 未満	初回減少:他の毒性を認めなければ減量不要。認めれば1段階減量
PLT	3万/mm <sup>3</sup> 未満	1段階減量
その他	CLcrが30以上60mL/min未満の時、10mg/日 連日投与 CLcrが30mL/min未満の時、15mg/日 隔日投与 透析患者では、5mg/日 連日投与 減量方法:25mg→15mg→10mg→5mg	

1クール期間 28日  
(次のクールまでの標準期間)

総クール数 PDまで

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(ダラキューロ)	15mL	皮下 <sup>※1</sup>	3-5min	day1,8,15,22(1,2サイクル)
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(ダラキューロ)	15mL	皮下 <sup>※1</sup>	3-5min	day1,15(3-6サイクル)
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ(ダラキューロ)	15mL	皮下 <sup>※1</sup>	3-5min	day1(7サイクル以降)
レナリドミド(レブラミド)	25mg/body	経口		day1-21
デキサメタゾン(レナデックス) <sup>※2</sup>	20mg/body	経口		day1,2,8,9,15,16,22,23(1,2サイクル)
デキサメタゾン(レナデックス) <sup>※2</sup>	20mg/body	経口		day1,2,15,16(3-6サイクル)
デキサメタゾン(レナデックス) <sup>※2</sup>	40mg/body	経口		day9, 23(3-6サイクル)
デキサメタゾン(レナデックス) <sup>※2</sup>	20mg/body	経口		day1,2(7サイクル以降)
デキサメタゾン(レナデックス) <sup>※2</sup>	40mg/body	経口		day9, 16, 23(7サイクル以降)

※1 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に投与。同一部位の反復投与は避ける。痛みがある場合、減速または中止し、残液を左右反対側の腹部に投与可。

※2 75歳を超える又は過小体重 (BMI: 18.5kg/m<sup>2</sup>) の患者にはデキサメタゾンを20mg/週で投与することも可能。その場合、ダラツムマブ投与前のみに20mgを投与。

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
1,2サイクル day1, 8, 15, 22 <内服>ダラキューロ投与1時間前 ・レナデックス錠(4)5T ・アセトアミノフェン錠(200)4T ・ポラミン錠(2)1T <皮下注> <sup>※1</sup> ①ダラキューロ配合皮下注 15mL/V(3-5分) 1,2サイクル day2, 9, 16, 23 <内服> ・レナデックス錠(4)5T 3-6サイクル day1, 15 <内服>ダラキューロ投与1時間前 ・レナデックス錠(4)5T ・アセトアミノフェン錠(200)4T ・ポラミン錠(2)1T <皮下注> <sup>※1</sup> ①ダラキューロ配合皮下注 15mL/V(3-5分) 3-6サイクル day2, 16 <内服> ・レナデックス錠(4)5T 3-6サイクル day9, 23 <内服> ・レナデックス錠(4)10T 7サイクル以降 day1 <内服>ダラキューロ投与1時間前 ・レナデックス錠(4)5T ・アセトアミノフェン錠(200)4T ・ポラミン錠(2)1T <皮下注> <sup>※1</sup> ①ダラキューロ配合皮下注 15mL/V(3-5分) 7サイクル以降 day2 <内服> ・レナデックス錠(4)5T 7サイクル以降 day9, 16, 23 <内服> ・レナデックス錠(4)10T 全サイクル <内服> レブラミド25mg 分1 寝る前 d1-21