

レジメン名

Kd
----

出典 カイプロリス適正使用ガイド2021年11月作成

## 実施部署区分

<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

対象疾患

多発性骨髄腫
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## 投与減量の基準

その他			

## 投与中止の基準

ANC	1000/mm <sup>3</sup> 未満	PLT	2.5万/mm <sup>3</sup> 未満
Hb	6.5g/dL未満		
その他			

1クール期間 総クール数 

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
1コース目				
カルフィルゾミブ(カイプロリス)	20mg/m <sup>2</sup>	5%糖液100mL <sup>*</sup>	30min	d1.2
カルフィルゾミブ(カイプロリス)	56mg/m <sup>2</sup>	5%糖液100mL <sup>*</sup>	30min	d8.9.15.16
デキサメタゾン(レナデックス)	20mg/body	経口		d1.2.8.9.15.16.22.23
2コース目				
カルフィルゾミブ(カイプロリス)	56mg/m <sup>2</sup>	5%糖液100mL <sup>*</sup>	30min	d1.2.8.9.15.16
デキサメタゾン(レナデックス)	20mg/body	経口		d1.2.8.9.15.16.22.23
※ 調製時、CSTD(ケモセーフロック®バイアルアダプター)使用により白色浮遊物発生。シリコンオイルとカルフィルゾミブの複合体であればインラインフィルター使用で除去されるが、コアリング等との判別が困難であるため、2022/2/17より調製時にはCSTD使用不可とした。また、投与時インラインフィルター不要とした。				

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
d1、2 ①生食50mL(ルート確保用) ②カイプロリス20mg/m <sup>2</sup> +注射用水5mL/10mg+5%糖液100mL(30min) <sup>*</sup> ③生食50mL(フラッシュ用)
d8、9、15、16 ①生食50mL(ルート確保用) ②カイプロリス56mg/m <sup>2</sup> +注射用水5mL/10mg+5%糖液100mL(30min) <sup>*</sup> ③生食50mL(フラッシュ用) d1、2、8、9、15、16、22、23 ④レナデックス20mg 分1
2コース目以降 d1、2、8、9、15、16 ①生食50mL(ルート確保用) ②カイプロリス56mg/m <sup>2</sup> +注射用水5mL/10mg+5%糖液100mL(30min) <sup>*</sup> ③生食50mL(フラッシュ用) d1、2、8、9、15、16、22、23 ④レナデックス20mg 分1